Diagnosi Istopatologica & Stadiazione della Micosi Fungoide (MF) e della Sindrome di Sézary (SS)



CRITERI DI STADIAZIONE

LESIONI CUTANEE			
T_0	Assenza di lesioni clinicamente sospette		
T_1	Chiazze, placche o papule, <10% BSA	T_{1A}	Lesioni solo a chiazze
		T_{1B}	Lesioni a chiazze, placche/papule
T_2	Chiazze, placche o papule, ≥10% BSA	T_{2A}	Lesioni solo a chiazze
		T_{2B}	Lesioni a chiazze, placche/papule
T_3	Uno o più tumori di diametro ≥1 cm		
T_4	Confluenza dell'eritema che copre più dell'80% della superficie corporea (i pazienti con eritroderma e tumore possono essere indicati come T4 [T3])		

NODI			
N_0	Nessun linfonodo (LN) clinicamente anomalo; non è necessaria la biopsia		
		Clone negativo o ambiguo	Clone positivo e identico alla pelle
N_1	Dutch di grado 1 o NCI LN 0-2	N1A	N1B
N_2	Dutch di grado 2, NCI LN3	N2A	N2B
N_3 **linfoma**	Dutch di grado 3-4, NCI LN4	N3A	N3B
N_x	Nodo periferico o centrale clinicamente anomalo, ma senza determinazione patologica di un LN rappresentativo. Sono anomali i LN >1,5 cm		

Elaborazione grafica di Tab. 2 rif. 1

BSA: *Body Surface Area*; **EORTC:** *European Organization of Research and Treatment of Cancer*; **ISCL:** *International Society for Cutaneous Lymphomas*; **MF:** micosi fungoide; **SS:** sindrome di Sézary; **USCLC:** *United States Cutaneous Lymphoma Consortium.*

Diagnosi Istopatologica & Stadiazione della Micosi Fungoide (MF) e della Sindrome di Sézary (SS)



CRITERI DI STADIAZIONE

SANGUE*			
	Coinvolgimento ematico	Clone	
		Negativo o ambiguo	Positivo e identico alla pelle
B_0	Assenza di significativo coinvolgimento	B0A	B0B
B_1	Basso carico tumorale	B1A	B1B
B_2	Alto carico tumorale	B2A	B2B
B_x	Impossibile quantificare secondo le linee guida	BXA	BXB

VISCERE		
M_0	Nessun coinvolgimento viscerale	
M_{1A}	Coinvolgimento del solo midollo osseo	Clone positivo e identico alla pelle
		Clone negativo o indeterminato
M_{1B}	Coinvolgimento viscerale non midollo osseo	Clone positivo e identico alla pelle
		Clone negativo o indeterminato
M_X	Il coinvolgimento viscerale non è né confermato né smentito dalla valutazione patologica o di *imaging* disponibile	

Elaborazione grafica di Tab. 2 rif. 1

inquadra qui per il
CALCOLATORE DELLA STADIAZIONE TNMB

*La stadiazione ematica per la MF/SS e ulteriormente definita come B_0 <250/µL di cellule CD4+/CD26- o CD4+/CD7-, B1 = non soddisfa i criteri per B_0 o B_2, e B_2 ≥1000/µL di cellule CD4+/CD26- o CD4+/CD7- o altra popolazione aberrante di linfociti identificata dalla citometria a flusso.[1]

Bibliografia: **1.** *Olsen EA, Whittaker S, Willemze R, et al. Primary cutaneous lymphoma: recommendations for clinical trial design and staging update from the ISCL, USCLC, and EORTC. Blood. 2022;140:419-437.*

KYOWA KIRIN